

BIOLINK COBRE

ACTIVADOR ENZIMÁTICO,
CORRECTOR DE CARENCIAS
DE COBRE.



01 COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno orgánico	5.0
Cobre Soluble en agua	8.0
Aminoácidos	31.2

02 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	Verde oscuro
Olor	Característico de los hidrolizados proteicos.6-7
pH de la solución	2.5-3.5
Densidad	1260-1280 g/l
Solubilidad en agua	Completamente soluble en agua
Persistencia de espuma	No aplica, el producto no provoca formación de espuma en diluciones en agua.



03 TOXICOLOGÍA

No existen estudios específicos de toxicidad del producto. No existe peligro averiguable en la ordinaria utilización como abono, sin embargo en base al sistema de cálculo toxicológico señalado en la ley CE sobre "La clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos" (Directiva 1999/45/CE y Directiva 2001/58/CE) el producto es clasificado NO PELIGROSO y sin efectos tóxicos para la salud humana.

04 MODO DE ACCIÓN

BIOLINK COBRE es un abono líquido para uso foliar, formulado para la prevención y la corrección de la fisiopatía de la carencia de cobre. Los aminoácidos de origen natural presentes en la formulación, favorecen la penetración del metal en la célula, confiriendo por tanto, una elevada eficacia biológica al producto.

05 MECANISMO DE ACCIÓN

El cobre es absorbido por la planta en cantidades bastante pequeñas, sin embargo, en determinadas condiciones ambientales y en algunas especies vegetales, su carencia puede resultar manifiesta. En los suelos ácidos, ricos en materia orgánica y en suelos calcáreos con pH elevado, a veces los niveles de cobre asimilable resultan inadecuados a las exigencias de las plantas **BIOLINK COBRE** es un abono líquido para uso foliar, formulado para la prevención y la corrección de la fisiopatía de la carencia de cobre. Los aminoácidos de origen natural presentes en la formulación, favorecen la penetración del metal en la célula, confiriendo por tanto, una elevada eficacia biológica al producto.

El cobre es absorbido por la planta en cantidades bastante pequeñas, sin embargo, en determinadas condiciones ambientales y en algunas especies vegetales, su carencia puede resultar manifiesta. En los suelos ácidos, ricos en materia orgánica y en suelos calcáreos con pH elevado, a veces los niveles de cobre asimilable resultan inadecuados a las exigencias de las plantas.

06 RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	250 ml / 200 l	Aplicar 2 veces por ciclo de cultivo o en época de desarrollo vegetativo	1era aplicación al retape, vía drench. 2da aplicación a la deshierba, vía foliar.
Tomate riñon (<i>Solanum lycopersicum</i>)	250 ml / 200 l	Durante la etapa vegetativa hasta antes de la floración	Aplicar con una frecuencia de 15 a 20 días, vía foliar.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	300 ml / 200 l	Realizar tres aplicaciones entre la etapa vegetativa e inicio de embuchamiento	1era aplicación 15 días después de la siembra. 2da aplicación 45 días después de la siembra. 3era aplicación 70 días después de la siembra. Vía foliar.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	300 ml / 200 l	Realizar 2 a 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, desde el inicio de desarrollo hasta el inicio de la floración.	Realizar 2 a 3 aplicaciones con frecuencia de 10 a 15 días, vía foliar.
Soya (<i>Glycine max</i>) Fréjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	300 ml / 200 l	Realizar 2 aplicaciones entre la etapa vegetativa y etapa reproductiva.	1era aplicación al inicio del crecimiento 2da aplicación antes de la floración. Vía foliar
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i> sub. <i>cymosa</i>)	300 ml / 200 l	Aplicar durante la etapa vegetativa	Aplicar a los 8 días después del transplante, vía foliar.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	500 ml /200 l	Realizar 2 aplicaciones al año	1era aplicación después de la poda. 2da aplicación antes de la floración. Vía foliar.
Banano (<i>Musa acuminata</i> sp.)	0.5 l / ha	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo	Aplicar con frecuencia de 4 semanas. Vía foliar
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	0.5 ml / l	Después del pinch.	Aplicar después del pinch Vía drench
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	2.5 l / ha o 500 ml / 200 l	Aplicar 3 a 4 veces por ciclo de cultivo	Aplicar 3 a 4 veces con frecuencia de 30 días. Vía foliar
Mango (<i>Mangifera indica</i>) Tomate de árbol (<i>Tomate de árbol</i>)	0.5 ml / l	Realizar 2 aplicaciones durante la etapa vegetativa	1ra aplicación después de la poda. 2da aplicación antes de la floración. Vía foliar

07 COMPATIBILIDAD

Evitar mezclas con compuestos con fuerte reacción alcalina, aceite blanco, azufre, polisulfuros.

08 N° DE REGISTRO 1898-F-AGR

09 PRESENTACIONES 210 l, 20 l, 1 l, 500 ml, 250 ml