



NUTRICIÓN

# ► BIOLINK ZINC

## ► FERTILIZANTE ACTIVADOR DE CRECIMIENTO CORRECTOR DE CARENCIAS DE ZINC

**BIOLINK ZINC** es un proteinato de zinc, que se encuentra en estado líquido. Tiene una formulación de nueva generación en fertilizantes en donde el nutriente se encuentra quelatado o complejoado con aminoácidos libres. Esta combinación con nitrógeno orgánico, facilita la asimilación del zinc en forma rápido y segura.



Febres Cordero Compañía de Comercio S.A.  
km 3.5 Vía Durán - Tambo  
PBX: (04)-5010550 ext. 152-153  
f Afecor @ afecor.ec  
[www.afecor.com](http://www.afecor.com)

# BIOLINK ZINC

APLICACIÓN: FOLIAR  
N° DE REGISTRO: 0050-F-AGR-G

## COMPOSICIÓN

|                       |                              |                       |                                    |                       |             |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>4,0</b><br>p/v[%]  | NITRÓGENO (N)<br>TOTAL       | <b>4,0</b><br>p/v[%]  | NITRÓGENO (N)<br>ORGÁNICO<br>TOTAL | <b>10,0</b><br>p/v[%] | ZINC (Zn)   |
| <b>26,0</b><br>p/v[%] | MATERIA<br>ORGÁNICA<br>TOTAL | <b>24,0</b><br>p/v[%] | AMINOÁCIDOS<br>TOTALES             | <b>00.5</b><br>p/v[%] | VITAMINA B1 |

## USOS

| CULTIVOS                                                 | DOSIS (l/ha) | ÉPOCA DE APLICACIÓN                                                               | VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )                        | 1.0          | Realizar 3 aplicaciones, a la siembra y cuando las plantas tengan de 6 a 8 hojas. | 1era. Aplicación al surco de siembra.<br>En etapa vegetativa cada 3 a 4 semanas, vía foliar.                                   |
| Lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )                        | 2.5 ml/l     | Aplicar 7 días después del trasplante y formación de pella/hojas.                 | Realizar 2 aplicaciones con intervalos de 7 días.<br>Vía foliar.                                                               |
| Tomate riñón ( <i>Solanum lycopersicum</i> )             | 1.0          | Realizar 3 aplicaciones, durante la etapa vegetativa hasta antes de la floración. | Aplicar cuando la planta tenga 6 a 8 hojas y cada 3 a 4 semanas.<br>Vía foliar.                                                |
| Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )                            | 1.0          | Realizar 2 aplicaciones en la etapa vegetativa.                                   | Aplicar entre los 15 a 20 días después de la siembra, repetir 15 días después.<br>Vía foliar.                                  |
| Maíz ( <i>Zea mays</i> )                                 | 1.0          | Realizar 2 aplicaciones durante la etapa fenológica vegetativa.                   | Aplicar con frecuencia de 15 días.<br>Vía foliar.                                                                              |
| Soya ( <i>Glycine max</i> )                              | 1.0          | Realizar 2 aplicaciones entre la etapa vegetativa y etapa reproductiva.           | Aplicar a las 4 semanas y después de la formación de vainas.<br>Vía foliar.                                                    |
| Fréjol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )                     | 1.0          | Aplicar durante la etapa vegetativa.                                              | Aplicar a los 8 días después del trasplante.<br>Vía foliar.                                                                    |
| Brócoli ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ) | 1.0          | Realizar 2 aplicaciones al año.                                                   | Aplicar entre la floración y el inicio del cuajado de mazorcas.<br>Vía foliar.                                                 |
| Cacao ( <i>Theobroma cacao</i> )                         | 1.0          | Aplicar durante todo el ciclo de cultivo.                                         | En plantilla, aplicar al follaje y al suelo.<br>En plantación establecida aplicar dirigido al hijo, repetir cada 30 a 40 días. |
| Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)                      | 0.5 ml/l     | Realizar de 2 a 3 aplicaciones en las primeras etapas de desarrollo.              | Aplicar cada 3 a 4 semanas, según la necesidad de la planta.<br>Vía foliar.                                                    |
| Piña ( <i>Ananas comosus</i> )                           | 2.5          | Aplicar 3 veces por ciclo de cultivo.                                             | Aplicar con frecuencia de 30 días entre aplicación.<br>Vía foliar.                                                             |
| Mango ( <i>Mangifera indica</i> )                        | 2.5          | Realizar 2 aplicaciones durante la etapa vegetativa.                              | 1era. Aplicación: Después de la poda.<br>2da. Aplicación: Antes de la floración.<br>Vía foliar.                                |
| Tomate árbol ( <i>Solanum betaceum</i> )                 | 2.0          | Realizar 2 aplicaciones durante la etapa vegetativa.                              | 1era. Aplicación: Después de la poda.<br>2da. Aplicación: Antes de la floración.                                               |

