



NUTRICIÓN

► BIOLINK COBRE

► ACTIVADOR ENZIMÁTICO, CORRECTOR DE CARENCIAS DE COBRE

BIOLINK COBRE es un abono líquido para uso foliar, formulado para la prevención y la corrección de la fisiopatía de la carencia de cobre. Los aminoácidos de origen natural presentes en la formulación, favorecen la penetración del metal en la célula, confiriendo por tanto, una elevada eficacia biológica al producto.



Febres Cordero Compañía de Comercio S.A.
km 3.5 Vía Durán - Tambo
PBX: (04)-5010550 ext. 152-153
f Afecor @ afecor.ec
www.afecor.com

BIOLINK COBRE

APLICACIÓN: FOLIAR
N° DE REGISTRO: 1898-F-AGR

COMPOSICIÓN

5,8 NITRÓGENO (N)
ORGÁNICO
p/v(%)

8,0 COBRE (Cu)
SOLUBLE EN
AGUA
p/v(%)

31,2 AMINOÁCIDOS
TOTALES
p/v(%)

USOS

CULTIVOS	DOSIS (l/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	250 ml / 200 l	Aplicar 2 veces por ciclo de cultivo o en época de desarrollo vegetativo	1era aplicación al retape, vía drench. 2da aplicación a la deshierba, vía foliar.
Tomate riñon (<i>Solanum lycopersicum</i>)	250 ml / 200 l	Durante la etapa vegetativa hasta antes de la floración	Aplicar con una frecuencia de 15 a 20 días, vía foliar.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	300 ml / 200 l	Realizar tres aplicaciones entre la etapa vegetativa e inicio de embuchamiento	1era aplicación 15 días después de la siembra. 2da aplicación 45 días después de la siembra. 3era aplicación 70 días después de la siembra. Vía foliar.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	300 ml / 200 l	Realizar 2 a 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, desde el inicio de desarrollo hasta el inicio de la floración.	Realizar 2 a 3 aplicaciones con frecuencia de 10 a 15 días, vía foliar.
Soya (<i>Glycine max</i>) Fréjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	300 ml / 200 l	Realizar 2 aplicaciones entre la etapa vegetativa y etapa reproductiva.	1era aplicación al inicio del crecimiento 2da aplicación antes de la floración. Vía foliar
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis sub. cymosa</i>)	300 ml / 200 l	Aplicar durante la etapa vegetativa	Aplicar a los 8 días después del transplante, vía foliar.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	500 ml / 200 l	Realizar 2 aplicaciones al año	1era aplicación después de la poda. 2da aplicación antes de la floración. Vía foliar.
Banano (<i>Musa acuminata</i> sp.)	0.5 l / ha	Aplicar durante todo el ciclo del cultivo	Aplicar con frecuencia de 4 semanas. Vía foliar
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	0.5 ml / l	Después del pinch.	Aplicar después del pinch Vía drench
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	2.5 l / ha o 500 ml / 200 l	Aplicar 3 a 4 veces por ciclo de cultivo	Aplicar 3 a 4 veces con frecuencia de 30 días. Vía foliar
Mango (<i>Mangifera indica</i>) Tomate de árbol (<i>Tomate de árbol</i>)	0.5 ml / l	Realizar 2 aplicaciones durante la etapa vegetativa	1ra aplicación después de la poda. 2da aplicación antes de la floración. Vía foliar

