



NUTRICIÓN

▶ ACTIVA

▶ INICIADOR Y ESTIMULANTE DE LA ACTIVIDAD RADICULAR Y DEL DESARROLLO VEGETATIVO

ACTIVA optimiza el desarrollo de las raíces; reduce el estrés típico de post-trasplante; al aplicar al suelo mejora las características químicas, exaltando la fertilidad microbiana y enzimática, además estimula el desarrollo vegetativo.



Febres Cordero Compañía de Comercio S.A.
km 3.5 Vía Durán - Tambo
PBX: (04)-5010550 ext. 152-153
f Afecor @ afecor.ec
www.afecor.com

▶ ACTIVA

APLICACIÓN: FOLIAR - SUELO
N° DE REGISTRO: 844-F-AGR

COMPOSICIÓN

3,8

EXTRACTO DE
ALGAS

p/v(%)

12,1

NITRÓGENO
TOTAL (N)

p/v(%)

7,0

MATERIA
ORGÁNICA
TOTAL

p/v(%)

5,9

AMINOÁCIDOS
TOTALES

p/v(%)

12,1

ANHÍDRIDO
FOSFÓRICO
(P₂O₅)

p/v(%)

0,18

ZINC (Zn)

p/v(%)

USOS

CULTIVOS	DOSIS (l/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>) Maíz (<i>Zea mays</i>) Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	2.0	1 a 2 aplicaciones en etapa de desarrollo vegetativo en los primeros 30 días del cultivo.	Foliar
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Tomate riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>) Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	2.0	1 aplicación en el semillero y 1 aplicación en drench al trasplante. 2 aplicaciones durante la etapa vegetativa.	Suelo Foliar
Arveja (<i>Pisum sativum</i>) Soya (<i>Glycine max</i>) Fréjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Maní (<i>Arachis hypogaea</i>)	1.5	3 aplicaciones cada 15 días, en la etapa de desarrollo hasta inicio de la floración.	Foliar
Melón (<i>Cucumis melo</i>) Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>) Pepinillo (<i>Cucumis sativus</i>)	1.0	1 aplicación en el semillero y 1 aplicación en drench al trasplante. 2 aplicaciones foliares durante la etapa vegetativa.	Suelo Foliar
Col (<i>Brassica oleracea</i> var. capitata) Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. italica)	1.0	1 aplicación en el semillero y 1 aplicación en drench al trasplante. 2 aplicaciones foliares durante la etapa vegetativa.	Suelo Foliar
Cebolla (<i>Allium cepa</i>) Zanahoria (<i>Daucus carota</i>) Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	2.0	1 aplicación en el semillero y 1 aplicación en drench al trasplante 2 aplicaciones foliares durante la etapa vegetativa.	Suelo Foliar
Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>) Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	1.0 1.5	Luego de trasplante realizar 3 aplicaciones cada 15 días en etapa de desarrollo vegetativo y una adicional después de 30 días. 2 aplicaciones en la corona dirigida al hijuelo cada 30 días en etapa de producción en época de verano.	Foliar Suelo
Piña (<i>Ananas comosus</i>) Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1.5 2.0	3 - 4 aplicaciones después de la siembra para estimular la formación de raíces y durante las primeras etapas de desarrollo vegetativo. 2 - 3 aplicaciones con frecuencia de 20 a 30 días a partir de realizada la poda.	Foliar Foliar
Papaya (<i>Carica papaya</i>) Naranja (<i>Solanum quitense</i>)	1.5 2.0	1 a 2 aplicaciones en la corona de la planta, en etapa de producción, entre inicio y salida de lluvias. En época seca realizar 1 a 2 aplicaciones con frecuencia de 30 días en etapa de producción. 3 aplicaciones desde la etapa vegetativa hasta la floración.	Suelo Foliar
Pitahaya (<i>Hylocereus megalanthus</i>) Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	1.5	2 aplicaciones en drench en la entrada de verano en etapa de producción. 2 - 3 aplicaciones desde la brotación hasta la fructificación.	Foliar Foliar
Fresa (<i>Fragaria ananassa</i>) Limón (<i>Citrus limon</i>)	2.0	2 aplicaciones en etapa vegetativa entre época de lluvia y época seca. 2 aplicaciones entre el inicio y la salida de lluvias y 3 aplicaciones entre la etapa vegetativa y floración.	Suelo Foliar
Rosa (<i>Rosa</i> sp.) Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	1 ml / l	2.5 ml / l / m ² en banco de enraizamiento y 1 ml/l al trasplante. 1 ml/l cada 3 meses en cultivo establecido por sistema de riego o por drench.	Suelo

