

1. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:

Ingrediente Activo	Tebuconazole + Triadimefon
Concentración	Tebuconazole: 225 g/l Triadimefon: 75 g/l
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo químico	Triazoles
Fórmula química	Tebuconazole: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol Triadimefon: 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
Nombre químico	
Peso molecular	Tebuconazole: 307.82 g/mol Triadimefon: 293.8 g/mol

2. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Tebuconazole y Triadimefon son fungicidas sistémicos, con acción protectante, curativa y erradicante, actúan como Inhibidores de la demetilación de los esteroides (biosíntesis de ergosterol).

3. COMPATIBILIDAD:

SILVERADO es compatible con la mayoría de plaguicidas u otros químicos usados para la protección de plantas. En cualquier caso se recomienda hacer una prueba previa, bajo su responsabilidad, con las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

4. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Arroz: realizar 2 aplicaciones, la primera en fase de embuchamiento y la segunda cuando el cultivo tenga aproximadamente un 10% de floración.

Para el resto de cultivos: iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad con un intervalo de 14 días. Se recomienda no hacer más de 2 aplicaciones.

6. PERÍODO DE REINGRESO:

Se debe esperar un mínimo de 4 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada.

7. MODO DE EMPLEO:

Aplicar de forma homogénea cubriendo todo el follaje de las plantas, utilizando una bomba de mochila manual. No aplicar con presencia de vientos fuertes o altas temperaturas, para la preparación de la mezcla ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **SILVERADO**, mezcle lentamente hasta homogenizar la mezcla y complete el volumen total con agua.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/h)	PERIODO DE CARENIA
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Pudrición de la Vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.75	35 días
Ajo (<i>Allium sativum</i>)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Pudrición blanca (<i>Sclerotium</i> sp.) Botrytis (<i>Botrytis</i> sp.)	0.50	21 días
Cebolla bulbo (<i>Allium cepa</i>)			
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.50	30 días
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.40	1 día
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.50	1 día

8. MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”. “No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón”. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.


9. MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta.

10. PRESENTACIONES 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 l , 5 l, 10l, 20 l , 200 l

12. NÚMERO DE REGISTRO 217-F 1/NA

13. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



14. CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

 EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. Para mayor información dirigirse a: QUATROAGRO ECUADOR S.A. Telf.: (+593) 2-4523319.