

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
TOMATE RIÑÓN (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	ENROLLADOR DE LA HOJA (<i>Tuta absoluta</i>)	0.5 l/ha	7 días
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	GUSANO COGOLLERO (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.4 l/ha	35 días

08 MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

09 MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Instrucciones para el médico:

Síntomas de intoxicación:

Contacto: Irritación de los ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales. Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal.

Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, aumento de las secreciones nasal y bronquial. Tratamiento médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No existe un antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta".

10 NÚMERO DE REGISTRO 13-H 6 / NA

11 PRESENTACIONES 1 l, 1 Gl, 5 Gl, 20 l, 200 l

12 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA



13 CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: **1800 VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día Centro de Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).

01 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Ingrediente Activo	Lufenuron
Concentración	50 g/l
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico	Benzoylurea
Fórmula molecular	$C_{17}H_8Cl_2F_8N_2O_3$
Nombre químico IUPAC	IUPAC: (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Peso molecular	511.1

02 MODO DE ACCIÓN

GARBO, es un insecticida sistémico que actúa por ingestión.

03 MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibidor de la síntesis de la quitina. Las larvas son incapaces de mutar y también dejan de alimentarse.

04 COMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con pesticidas de acción alcalina (azufre, cobre).

05 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Tomate riñón: Se recomienda aplicar en etapa de desarrollo vegetativo (60 días del trasplante) en cuanto el cultivo presente daños en las hojas, en dos aplicaciones, con un intervalo de 7 días.

Maíz: Se recomienda aplicar en fase de crecimiento V2-V5 (10 a 25 días después de la siembra) cuando se presenten 3 - 5 larvas/m², en dos aplicaciones, con un intervalo de 3 días.

06 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Tóxico por inhalación, ingestión y contacto". "Nocivo puede causar daño pulmonar si se ingiere". "Irrita las vías respiratorias". "Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)". Producto Inflamable.

07 RECOMENDACIONES DE USO

La aplicación se la efectúa bajo el criterio de buenas prácticas agrícolas. Agregar agua limpia y fresca hasta la mitad del volumen del recipiente a ser utilizado, mezclar la dosis recomendada de **GARBO**, agitar y mezclar bien la solución. Agregar poco a poco agua, hasta completar el volumen requerido y agitar para homogenizar la mezcla. La aplicación se debe realizar dirigida sobre el follaje de las plantas.