

07 RECOMENDACIONES DE USO

Para banano se puede aplicar en suspensión, solo aceite, o emulsión aceite-agua, usando un volumen de mezcla desde 11 hasta 15 l/ha.

Preparación de la emulsión: Adicionar al tanque de mezcla, mientras se agita el aceite, el emulsificante al 1% del volumen de aceite a usar y luego la mitad del agua. Una vez hecha la emulsión agregar la dosis de **DIFECOR** y posteriormente completar con el resto del agua, el volumen previsto, en constante agitación. Para otros cultivos llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria. Mantener agitación constante, completar con agua hasta el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.4 l/ha	0 días
ARVEJA (<i>Pisum Sativum</i>)	MANCHA CAFÉ (<i>Ascochyta pisi</i>)	0.4 l/ha	7 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	AÑUBLO DE LA VAINA (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.5 l/ha	28 días

08 MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

09 MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

Tratamiento médico: Si ha ingerido el producto haga un lavado gástrico con carbón medicinal. Siga tratamiento sintomático. "En caso de intoxicación llame al médico o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta"

10 N° DE REGISTRO 067-F 8 / NA**11 PRESENTACIONES** 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 20 l, 200 l**12 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA****13 CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: **1800 VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día Centro de Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).

Elaborado por Departamento Técnico AFECOR

01 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Ingrediente Activo	Difenoconazole
Concentración	250 g/l
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico	Triazole
Fórmula molecular	$C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$
Nombre químico IUPAC	3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-[1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
Peso molecular	406.3

02 MODO DE ACCIÓN

DIFECOR es un Fungicida sistémico con recomendado en el control preventivo y curativo de una amplia gama enfermedades en ornamentales.

03 MECANISMO DE ACCIÓN

DIFECOR es un fungicida sistémico con una novedosa actividad de amplio espectro, que protege el rendimiento y la calidad del cultivo, mediante aplicación foliar. Tienen actividad preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta y por lo tanto no se lava con lluvia. El movimiento en el interior de las hojas y ápices vegetativos es esencialmente translaminar y la traslocación acrópeta. El difenoconazole es un inhibidor de la desmetilación del esterol. Inhibe la biosíntesis del ergosterol de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

04 COMPATIBILIDAD

DIFECOR es compatible con la mayoría de fungicidas y fertilizantes de uso común, no es compatible con ácidos fuertes, álcalis, metales finos divididos, sulfuros. Se recomienda siempre comprobar, a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.

05 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En banano, según evolución de la enfermedad. No exceder de 8 aplicaciones por año, rotando con productos de diferente mecanismo de acción. En arveja con la presencia de los primeros síntomas por dos ocasiones con una frecuencia de 10 días. En arroz realizar dos aplicaciones a los 40 y 60 días de edad.

06 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

El producto puede causar irritación de los ojos y la piel. El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas. Irrita el sistema respiratorio, riesgo de lesiones oculares graves. Evitar el contacto con los ojos y la piel.