



BENOCOR WP

“PARA SER UTILIZADO EN MUSÁCEAS Y OTROS CULTIVOS EN EL CONTROL DE HONGOS ASCOMICETOS, BASIDIOMICETOS Y DEUTEROMICETOS”

Composición:

Benomil..... 500 g/kg
Excipientes c.s.p. 1 kg

INTRODUCCIÓN

Benocor® WP es un fungicida sistémico, de aplicación foliar con acción preventiva y curativa, como en el tratamiento de semillas, bulbos y esquejes, y en el tratamiento de suelos. De amplio espectro en el control de enfermedades en cultivos de ciclo corto y perennes.

INGREDIENTE ACTIVO : BENOMIL

FORMULACIÓN :

Benocor®WP está formulado como polvo mojable (WP) que contiene 500 gramos de ingrediente activo por kilo de producto formulado. Posee capacidad para adherirse sobre el follaje tratado.

NOMBRE QUÍMICO IUPAC: 1-(butylcarbamoil) bencimidazol-2 ilcarbamato de metilo.

Grupo químico: benzimidazoles.

COMPATIBILIDAD: Benocor® WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, no es compatible con productos alcalinos como Arseniato de calcio o caldo bordelés.

PRESENTACIONES

- * Funda de 100 gr.
- * Funda de 1 kilo.
- * Funda de 25 kilos.

ACTIVIDAD

Benocor® WP es un fungicida sistémico de absorción radicular y foliar, traslocación principalmente acrópeta y actividad por contacto preventiva y curativa. El ingrediente activo se transforma en la célula del hongo en metilbencimidazolil carbamato (MBC) y posteriormente a un mononucleótido activo. MBC actúa interfiriendo la síntesis del DNA, la mitosis y el mecanismo de transmisión de mensajes genéticos del DNA al RNA.



Indicaciones relativas al modo de empleo.- Preparación de la mezcla: Verter la cantidad correcta de **Benocor® WP** en un recipiente con agua limpia, agitar la mezcla hasta lograr una suspensión homogénea. Usar mayor volumen de agua en cultivos desarrollados. No aplicar el producto si está por llover.

Benocor® WP está recomendado en la prevención y cura de las enfermedades producidas por *Botrytis cinerea*, *Ceratocystis* sp., *Cercospora* spp., *Fusarium* spp., *Monilia* spp., *Sclerotinia* spp., *Septoria* spp., *Rhizoctonia solani*, *Venturia inaequalis*, *Verticillium* spp.

INSTRUCCIONES DE USO.-

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Quemazón Helmintosporiosis	<i>Pyricularia oryzae</i> <i>Helminthosporium oryzae</i>	300	Aplicar de acuerdo a la incidencia de la enfermedad
CAFÉ (<i>Coffea</i> spp.)	Antracnosis Mancha de hierro	<i>Colletotrichum</i> sp. <i>Cercospora coffeicola</i>	600-700	Aplicar según incidencia de la enfermedad
MELÓN (<i>Cucumis melo</i>) SANDÍA (<i>Citrullus lanatus</i>) PEPINO (<i>Cucumis sativus</i>) ZAPALLO (<i>Cucurbita pepo</i>)	Antracnosis Mildiu	<i>Colletotrichum lagenarium</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	350-500	Aplicar de acuerdo a la incidencia de la enfermedad
FREJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Antracnosis Mancha angular	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <i>Isariopsis griseola</i>	600-800	Aplicar cada 15 días o cuando se requiera
FRESAS (<i>Fragaria</i> sp.)	Pudrición gris Mancha de la hoja Cenicilla	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Mycosphaerella fragariae</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i>	150 g/ 100 l de agua	Aplicar según la incidencia de la enfermedad hasta 20 días antes de la cosecha
MANGO (<i>Mangifera indica</i>)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	300-500	Aplicar de acuerdo a la incidencia de la enfermedad
PIÑA <i>Ananas comosus</i>	Podredumbre	<i>Thielaviopsis paradoxa</i>	600-700	Sumergir la semilla, mojar completamente y secarla al medio ambiente
AJO (<i>Allium sativum</i>) CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>) COL (<i>Brassica campestris</i>) ZANAHORIA (<i>Daucus carota</i>)	Tizón tardío Moho blanco Antracnosis Mancha de la hoja	<i>Phytophthora</i> sp. <i>Sclerotinia</i> sp. <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Cercospora</i> sp.	350-500	Aplicar cada 7 días o cuando sea necesario

PERÍODO DE REINGRESO.- No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

INTERVALO DE SEGURIDAD.- No aplicar durante los 7 días que preceden a la cosecha.

REGISTRO N°: 036 - F 8

FORMULADO POR:



27A, 1381 Dong-Fang Road, Pudong,
Shanghai 200127, P.R. of CHINA
TEL: (86-21) 5870-7711 (5 Lines)
FAX: (86-21) 5670-7700
TAIWAN - CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

