



RATAQUILL®

(Brodifacoum 0.05 g/kg, SB)

IDENTIFICACIÓN

Nombre Común: Brodifacoum

Formulación: Cebo en trozos (SB)

Concentración: 0.05 g/kg

Grupo químico: hydroxycoumarin

Nombre químico IUPAC: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

Registro Nacional N°: 20 - V 1 /NA

Registro Sanitario: PE –SP – 00308-11-03



CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Estado físico

pH :

Explosividad:

Corrosividad:

Incompatibilidad:

Punto de Fusión:

Punto de Ebullición:

Sólido, de color rosado, olor a alimento concentrado
6.0

No es explosivo.

No es un producto corrosivo.

No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes.

No aplica para Rataquill (Pellets).

No aplica, para formulaciones sólidas.



TOXICOLOGÍA

Categoría Toxicológica: la EXTREMADAMENTE PELIGROSO

Oral LD₅₀ en ratas:

1.125 mg / kg de peso corporal.

Dérmica LD₅₀ en ratas:

1.710 mg / kg de peso corporal

Inhalatoria LC₅₀ en ratas:

0.43 mg / l de aire.

Irritación en los ojos:

Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.

Irritación en la piel:

Evite contacto con la piel y la ropa.

Sensibilización cutánea:

ciertas personas.

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en



MODO DE ACCIÓN

RATAQUILL® es un Anticoagulante indirecto.



MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibe los pasos dependientes de la vitamina K en la síntesis de los factores de coagulación II, VII, IX y X.
Contiene atrayentes alimenticios especiales para ratas y roedores. Produce una muerte lenta, a partir del cuarto día.

ÚLTIMA REVISIÓN:
17/01/2017

AR-006 FT
APROBADO:
A. REGULATORIOS





RATAQUILL®

(Brodifacoum 0.05 g/kg, SB)

RECOMENDACIONES DE USO

USO DOMÉSTICO

Aplique Rataquill en cantidades de 10 a 30 gramos en puntos o cebaderos donde tengan presencia transiten, coman las ratas o ratones. Estos pueden ser desagües, canales de riego, lagunas, gallones, establos, bodegas, techos, potreros, porquerizas, madrigueras, etc., según un previo monitoreo para conocer la población de individuos y los sitios o puntos de cebamiento; si son poblaciones altas coloque 30 gramos cada 5 metros, si son poblaciones bajas coloque 10 a 20 gramos cada 7 metros.



USO AGRÍCOLA

Aplicar RATAQUILL® directamente del sobre en cantidades de 5 a 10 g (aprox. 20 a 40 pellets o trocitos), a intervalos de 5 a 10 metros a lo largo de las áreas o sitios donde se tenga presencia, transiten, coman o habiten las ratas y ratones.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERIODO DE CARENCIA
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Rata cañera (<i>Sigmodom hispidus</i>)	2 kg/ha	No aplica

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se considera el nivel de umbral económico del 1 % del porcentaje de tallos con daño fresco, de ser necesario realizar una segunda aplicación con una frecuencia de 15 días.

PERIODO DE REINGRESO , FITOTOXICIDAD: No aplica.



COMPATIBILIDAD

No es compatible con ningún otro pesticida.

FABRICADO Y FORMULADO POR:



MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.
Carrera 16 # 10-42
Tel: (571) 3361021
Fax: (571) 3360924
Email: minagro@minagroindustry.com
Bogotá - Colombia

DISTRIBUIDO POR:



FEBRES CORDERO CÍA. DE COMERCIO S.A.
Vía Durán-Tambo Km 3.5
PBX: (04) 3729550
DURÁN - ECUADOR



ÚLTIMA REVISIÓN:
17/01/2017

AR-006 FT
APROBADO:
A. REGULATORIOS

